

TVS-N - Tidlig varslingskår-nyfødte, responskjema

Observasjon	RØD	GUL	HVIT	GUL	RØD
Respirasjon (pust/min)	≤ 25	26-29	30-60	61-79	≥ 80
Pressing		Ja	Nei	Ja	
SpO2 (%)	≤ 89	90-94	≥ 95		
Puls (slag/min)	≤ 79	80-94	95-160	161-174	≥ 175
Spising (etter første 4 levetimer)			Spiser godt	Spiser dårlig	Spiser ikke
Neurologi			Normal tonus og atferd	Hypoton/sitrer/irritabel	Svært hypoton/uvekkbar/kramper
Temperatur (°C)	$\leq 35,9$	36,0-36,4	36,5-37,5	37,6-37,9	$\geq 38,0$
Bekymring (foreldre/helsepersonell)		Ja	Nei	Ja	

1 gul



Varsle ansvarshavende jordmor og ny skåring innen 30 minutter.

≥ 2 gule



Varsle jordmor/barnelege. Avtale videre oppfølging.

1 rød



≥ 2 røde eller
eller 1 rød på
neurologi



Umiddelbart varsle ansvarshavende jordmor og tilkalle barnelege. Fortsette kontinuerlig overvåkning.

Barn som har hatt minst to separate unormale (gule eller røde) TVS-N-skår skal skåres videre tilsvarende barn med risikofaktorer for infeksjon.

Hvis du er bekymret for tilstanden til et barn, fortsett overvåkning og tilkall barnelege uavhengig av skåringsverdier.

Forenklet risikofaktorskjema

Risiko for infeksjon

Vannavgang >24, **ikke** adekvat IV ab til mor* ☐

Mor GBS i urin/UVI, **ikke** adekvat IV AB til mor* ☐

Korioamnionitt (mistanke) ☐

Maternell (vedvarende) intrapartum temp >38** ☐

GBS-infeksjon hos mors tidligere barn ☐

Minst 2 avvikende
TVS-N etter hverandre, følges intervall for TVS-N som infeksjon ☐

* Første dose minimum 4 timer før forløsning

** Tross enkle tiltak som væske, senket romtemperatur; febernedsettende

Føtal Distress/asfyksi/intrapartum

Ph < 7,05 i navlearterie ☐

BE ≤ -12 mmol/l i navlearterie ☐

Ventilert < 5 minutter ☐

Tykt misfarget fostervann ☐

Apgar < 6 etter 5 minutter ☐