

## Isoleringstiltak - Alfabetisk oversikt over infeksjonssykdommer

Gjelder for: Hele SiV  
 Dokumenttype: Prosedyre  
 Sist endret: 18.03.2024

SYKDOM	MIKROBE	SMITTEFØRENDE MATERIALE	SMITTEMÅTE	SMITTEVERN-TILTAK	KOMMENTARER
Erythema infectiosum (5. barnesykdom)	Parvovirus B19	Luftveissekret	Dråpesmitte Kontaktsmitte	Dråpesmitte	FHI: <a href="#">Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19) - veileder for helsepersonell</a>
ESBL-produserende bakterier	ESBL A/M	Avføring Urin Sårsekret Luftveissekret	Kontaktsmitte Fekal-oral Dråpesmitte	Forsterkede basale smvr. Kontaktsmitte evt dråpesmitte ved økt spredningsrisiko	<a href="#">ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak</a> FHI: <a href="#">ESBL holdige gramnegative stavbakterier - veileder for helsepersonell</a>
	ESBL KARBA	Avføring Urin Sårsekret Luftveissekret	Kontaktsmitte Fekal-oral Dråpesmitte	Kontaktsmitte Dråpesmitte ved økt spredningsrisiko	<a href="#">ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak</a> FHI: <a href="#">ESBL holdige gramnegative stavbakterier - veileder for helsepersonell</a>
Candida Auris		Hudavskrap	Kontaktsmitte	Kontaktsmitte	FHI: <a href="#">Candidiasis - veileder for helsepersonell</a>
Haemophilus Influenzae type b (HiB)		Luftveissekret	Dråpesmitte	Basale smittevernrutiner Dråpesmitte hvis uvaksinerte barn i avdelingen	FHI: <a href="#">Haemophilus influenzae-sykdom - veileder for helsepersonell</a>
Hepatitt A	Hepatitt A-virus	Avføring	Fekal-oral	Kontaktsmitte	FHI: <a href="#">Hepatitt A - veileder for helsepersonell</a>
Hepatitt E	Hepatitt E-virus	Avføring	Fekal-oral	Kontaktsmitte 1 uke etter debut av ikterus	FHI: <a href="#">Hepatitt E - veileder for helsepersonell</a>

SYKDOM	MIKROBE	SMITTEFØRENDE MATERIALE	SMITTEMÅTE	SMITTEVERN-TILTAK	KOMMENTARER
Herpes zoster/varicella (helvetesild)	Varicella zoster-virus	Vesikkelinnh.	Kontaktsmitte	Luftsmitte til alle lesjoner er tørre deretter basale smittevernrutiner	FHI: <a href="#">Varicella (vannkopper) og herpes zoster (helvetesild) - veileder for helsepersonell</a> I føde-og barselavdelinger er enerom nødvendig.
Influenza	Influenzavirus A/B	Luftveissekret	Dråpesmitte	Dråpesmitte	FHI: <a href="#">Sesonginfluensa</a> <a href="#">Sesonginfluensa - smitteverntiltak</a>
Kikhoste	Bordetella pertussis	Luftveissekret	Dråpesmitte	Dråpesmitte, 5 dager etter start av effektiv behandling.	FHI: <a href="#">Kikhoste (pertussis) - veileder for helsepersonell</a>
Konjunktivitt	Adenovirus	Øyesekret	Kontaktsmitte	Dråpesmitte Så lenge det er kliniske symptomer	FHI: <a href="#">Adenovirusinfeksjoner - veileder for helsepersonell</a>
Kopper		Luftveissekret	Dråpesmitte	Luftsmitte (høyriskosmitte)	FHI: <a href="#">Kopper og andre poxviridae-infeksjoner - veileder for helsepersonell</a>
Kusma	Parotittvirus	Luftveissekret	Dråpesmitte	Dråpesmitte 10 dager etter at hevelsen startet	FHI: <a href="#">Kusma - veileder for helsepersonell</a>
Linezolidresistente enterokokker (LRE)	Enterokokker	avføring	Dråpesmitte Kontaktsmitte	<b>Kontaktsmitte. Dråpesmitte ved økt spredningsrisiko luftveier</b>	<a href="#">ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak</a> FHI: <a href="#">Enterokokkinfeksjon (inkl. vankomycinresistente enterokokker, VRE) - veileder for helsepersonell</a>
Luftveisinfeksjon, særlig resistente bakterier	ESBL (alle typer) VRE, LRE, Penicillinresistente pneumokokker	Luftveissekret	Dråpesmitte	Dråpesmitte	<a href="#">ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak</a>
	MRSA	Luftveissekret	Dråpesmitte Kontaktsmitte	Kontaktsmitte med munnbind Intensivpasienter : Luftsmitte	<a href="#">MRSA- Mottak av pasient med kjent eller mistenkt infeksjon/kolonisering</a>
Lungepest		Luftveissekret	Luftsmitte	Luftsmitte med åndedrettsvern. Isoleres i 72 timer etter oppstart av effektiv antibiotikabehandling	FHI: <a href="#">Pest - veileder for helsepersonell</a>

SYKDOM	MIKROBE	SMITTEFØRENDE MATERIALE	SMITTEMÅTE	SMITTEVERN-TILTAK	KOMMENTARER
Luftveisinfeksjoner, virale	Influsavirus (A/B), RS-virus, humant metapneumovirus, koronavirus (SARS CoV-2),	Luftveissekret	Dråpesmitte (Luftsmitte)	Dråpesmitte med øyebeskyttelse	<a href="#">Smitteverntiltak - pasienter og ansatte med nyoppståtte virale luftveisinfeksjoner</a> <a href="#">Sesonginfluensa - smitteverntiltak</a> <a href="#">RS-virusinfeksjon - veileder for helsepersonell</a>
Mage-tarminfeksjon, bakteriell	Alle virus, bakterier og parasitter som gir gastroenteritt/enterokolitt  Noro/sapovirus	Avføring, urin	Fekal-oral, ofte via matvarer. Kontaktssmitte Dråpesmitte ved oppkast	Kontaktssmitte  Dråpesmitte (noro/sapo)	FHI: <a href="#">Campylobacteriose - veileder for helsepersonell</a> <a href="#">Clostridioides difficile (Clostridium difficile) - smitteverntiltak</a> FHI: <a href="#">Kolera - veileder for helsepersonell</a> <a href="#">Norovirus/sapovirus - smitteverntiltak</a> FHI: <a href="#">Norovirus og Sapovirus-enteritt - veileder for helsepersonell</a> FHI: <a href="#">Rotavirusssykdom - veileder for helsepersonell</a>
Meningokokksykdom (meningitt og sepsis)	Meningokokker ( <i>Neisseria meningitidis</i> )	Luftveissekret	Dråpesmitte	Dråpesmitte 1 døgn etter start av effektiv behandling.	FHI: <a href="#">Smittsom hjernehinnebetennelse</a>
Meslinger	Morbillivirus	Luftveissekret	Luftsmitte Dråpesmitte Kontaktssmitte	Luftsmitte med munnbind Åndedrettsvern ved ikke-immunt personale  Til 5 døgn etter debut av utslett	FHI: <a href="#">Meslinger (morbilli) - veileder for helsepersonell</a>
MRSA – infeksjon og bærerskap	Meticillinresistente gule stafylokokker	Puss, sårsekret, luftveissekret hudepitel	Kontaktssmitte Dråpesmitte Luftsmitte	Kontaktssmitte med munnbind Luftsmitteregime med munnbind ved økt spredningsrisiko hos intensivpasienter	Inntil mistanke er avkreftet eller så lenge pas er innlagt. FHI: <a href="#">MRSA-veilederen (Smittevern 16)</a> <a href="#">MRSA- Mottak av pasient med kjent eller mistenkt infeksjon/kolonisering</a>

SYKDOM	MIKROBE	SMITTEFØRENDE MATERIALE	SMITTEMÅTE	SMITTEVERN-TILTAK	KOMMENTARER
Mpox (apekopper)	orthopoxvirus	sårsekret	Kontaktsmitte	Dråpesmitte Luftmitte ved aerosolgenereren de prosedyrer	FHI: <a href="#">Mpox (apekopper)</a> <a href="#">Mpox - smitteverntiltak i helsetjenesten</a>
Poliomyelitt	Poliovirus	Avføring	Fekal-oral	Kontaktsmitte	FHI: <a href="#">Poliomyelitt (polio) - veileder for helsepersonell</a>
Røde hunder (rubella)	Rubellavirus	Luftveissekret	Dråpesmitte Luftmitte	Dråpesmitte, 1 uke etter debut av utslett.	FHI: <a href="#">Rubella (røde hunder) - veileder for helsepersonell</a>
SARS CoV/ MERS-CoV			Luftmitte	Luftmitte med åndedrettsvern og øyebeskyttelse	<a href="#">Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale (MERS og SARS) - unntatt COVID-19</a>
Skabb	Sarcoptes scabiei	Hudlesjoner	Kontaktsmitte	Kontaktsmitte	FHI: <a href="#">Skabb</a> <a href="#">Skabb - smitteverntiltak</a>
Tuberkulose -smitteførende lungetuberkulose	Mykobakterier	Luftveissekret	Luftmitte	Luftmitte med åndedrettsvern i 2 uker etter start av effektiv behandling.	FHI: <a href="#">Tuberkulose</a> <a href="#">Isolering, behandling og oppfølging av pasient med lungetuberkulose</a>
Vancomycinresistente enterokokker (VRE)	E. faecalis E. faecium	Feces Sårsekret Urin Luftveissekret	Kontaktsmitte	Kontaktsmitte. Dråpesmitte ved økt spredningsrisiko luftveier.	<a href="#">ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak</a>
Viral hemoragisk feber	Ebola, Marburg, Lassa mfl	Blod sekreter	Kontaktsmitte Inokulasjonsmitte	Luftmitte (høyrisikosmitte)	<a href="#">Smitteverntiltak ved viral hemoragisk feber (VHF)</a> <a href="#">Smittevern ved ebolavirusinfeksjon (EVD)</a>

## REFERANSER

[1.6.10.3.10](#)[1.6.10.4.4](#)[1.6.10.4.6](#)[1.6.10.4.7](#)[1.6.10.5.1](#)[1.6.10.5.2](#)[1.6.10.10.3](#)[1.6.10.10.4](#)[1.6.10.10.8](#)[1.6.10.10.9](#)[1.6.10.10.11](#)[1.6.10.11.2](#)[Smitteverntiltak - pasienter og ansatte med nyoppståtte virale luftveisinfeksjoner](#)[MRSA- Mottak av pasient med kjent eller mistenkt infeksjon/kolonisering](#)[ESBL, VRE og andre multiresistente tarmbakterier - smitteverntiltak](#)[Clostridioides difficile \(Clostridium difficile\) - smitteverntiltak](#)[Sesonginfluensa - smitteverntiltak](#)[Norovirus/sapovirus - smitteverntiltak](#)[Smittevern ved ebolavirusinfeksjon \(EVD\)](#)[Smitteverntiltak ved viral hemoragisk feber \(VHF\)](#)[Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale \(MERS og SARS\) - unntatt COVID-19](#)[Mpox - smitteverntiltak i helsetjenesten](#)[Skabb - smitteverntiltak](#)[Isolering, behandling og oppfølging av pasient med lungetuberkulose](#)

**EKSTERNE REFERANSER**

[FHI: Isoleringsveilederen. Bruk av isolering av pasienter for å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner. FHI 2004](#)