

MRSA- Mottak av pasient med kjent eller mistenkt infeksjon/kolonisering

Gjelder for: []
 Dokumenttype: Prosedyre
 Sist endret: 20.06.2023

1. HENSIKT


Begrense spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA).

2. ANSVAR

Helsepersonell med pasientkontakt.

3. FREMGANGSMÅTE

Medisinsk behandling i denne sammenheng omfatter alle innleggelser i sykehus samt polikliniske prosedyrer hvor kroppens naturlige barrierer er brutt, f.eks. ved suturering, kateterisering o.l. Besøk på poliklinikk/legekontor med vanlig undersøkelse inklusive f.eks. kontroll av blodtrykk, otoskopi eller liknende, blir da ikke indikasjon for prøvetaking. Det samme gjelder f.eks. anleggelse av gips eller bandasjering.



4. GENERELT

Meticillinresistente gule stafylokokker er resistente mot alle betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, og karbapenemer) og er i tillegg ofte resistente mot flere andre antibiotika.

5. INTERNE REFERANSER

1.6.10.2.1	Basale smittevernrutiner
1.6.10.3.2	Kontakt- og dråpesmitte- tiltak
1.6.10.3.5	Luftsmitte - tiltak
1.6.10.4.3	MRSA - Screening av bærerskap eller infeksjon

6. EKSTERNE REFERANSER

[MRSA-veilederen](#)