

Dørplakat- kontakt- dråpesmitte

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 20.06.2023



KONTAKT- OG DRÅPESMITTE



DØREN SKAL HOLDES LUKKET

Besøkende bes kontakte personalet før de går inn i rommet

<input type="checkbox"/> Kontaktmitte	<input type="checkbox"/> Kontaktmitte med munnbind	<input type="checkbox"/> Dråpesmitte
Smittefrakk Hansker	Smittefrakk Hansker Munnbind	Smittefrakk Hansker Munnbind Briller/visir
<i>Ved direkte kontakt</i>	<i>I hele rommet</i>	<i>Nærmere enn 1 meter</i>

Håndhygiene skal alltid utføres når rommet forlates!

Smitteregimer og beskyttelsesutstyr	Utvalgte infeksjoner og mikrober (se komplett oversikt i prosedyre D02140)
Kontaktmitte <ul style="list-style-type: none"> • Smittefrakk + hansker - Ved direkte kontakt med pasienten eller pasientens kroppsvæsker 	<ul style="list-style-type: none"> • Mage/tarm-infeksjon (unntak: norovirus eller sapovirus → <i>dråpesmitteisolering</i>) • Bærerskap eller infeksjon med ESBL-CARBA (unntak: luftveisinfeksjon med uttalt hoste → <i>dråpesmitteisolering</i>) • Bærerskap eller infeksjon med ESBL-A/M eller VRE/LRE og økt spredningsrisiko (unntak: luftveisinfeksjon med uttalt hoste → <i>dråpesmitteisolering</i>) • Bærerskap eller infeksjon med Candida auris • Utbredt bakteriell hud- eller bløtdelsinfeksjon med økt spredningsrisiko • Virus som smitter fekalt-oralt, f.eks hepatitt A, hepatitt E, enterovirus eller polio • Ubehandlet skabb
Kontaktmitte med munnbind <ul style="list-style-type: none"> • Smittefrakk + hansker + munnbind - I hele rommet 	<ul style="list-style-type: none"> • Bærerskap eller infeksjon med MRSA (unntak: MRSA hos intensivpasienter med økt spredningsrisiko → <i>luftsmitteisolering</i>)
Dråpesmitte <ul style="list-style-type: none"> • Smittefrakk + hansker + munnbind + briller/visir - Nærmere pasienten enn 1 meter og ved direkte kontakt med pasientens kroppsvæsker 	<ul style="list-style-type: none"> • Mage/tarm-infeksjon med norovirus eller sapovirus • Influenza (NB: aerosolgenererende prosedyrer → <i>åndedrettsvern</i> i hele rommet) • Covid-19 (NB: aerosolgenererende prosedyrer → <i>åndedrettsvern</i> i hele rommet) • Luftveisinfeksjon med RS-virus eller metapneumovirus • Konjunktivitt med adenovirus • Luftveisinfeksjon med uttalt hoste og særlig resistent bakterie i hals eller luftveier (f.eks ESBL-CARBA, ESBL-A/M, VRE/LRE eller penicillinresistente pneumokokker) • Infeksjon eller bærerskap med meningokokker • Kikhoste (pertussis), difteri, kusma, røde hunder (rubella) eller apekopper