

## **Enukleasjon/evicerasjon, fjerning av øyet.Pre- og postoperativ sykepleie**

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 16.04.2024

### **1.HENSIKT:**

Sikre forsvarlig pre-, og postoperativ sykepleie til pasienter som skal fjerne et øye.

### **2.ANSVAR:**

Sykepleier som har ansvar for øyepasienten den dagen.

### **3. FREMGANGSMÅTE:**

Operasjonen kan utføres i lokalanestesi eller narkose.

#### **Operasjonsdagen ved narkose:**

- Pasienten møter fastende på Kirurgisk Dagpost 4B etter angitt klokkeslett.
- Meldeskjema til operasjonsskjema skal være utfyllt. Ordinasjoner og premedikasjon skal være angitt i Metavision.
- Sjekk at det foreligger svar på pre-operative undersøkelser som er forordnet (EKG, røntgen Thorax, blodprøver etc).
- Dersom pasient har diabetes skal fastende blodsukker foreligge før pasient blir sendt til operasjon.
- Pasienten klargjøres til operasjon. Skal kun ha på truse og sykehuskjorte.
- Operasjon ringer og gir beskjed om tidspunkt for operasjon.
- Pasienten kjøres i seng.
- Ved ankomst operasjonsstue utstyres pasienten med grønn hette på hodet.

#### **Operasjon i lokalanestesi:**

- Pasienten møter, ikke fastende, på Kirurgisk Dagpost 4B etter angitt klokkeslett.
- Meldeskjema til operasjonsskjema skal være utfyllt. Ordinasjoner og premedikasjon skal være angitt i Metavision.
- Avklare med operatør om evt. premedikasjon.
- Pasienten kan spise og drikke.
- Operasjon ringer og gir beskjed om premedikasjon og tidspunkt for operasjon.
- Pasienten kan ha på seg private klær, men det bør være løstsittende i halsen. Sykehuskjorte utenpå klærne, uten smykker
- Kan ha på høreapparat, informer operasjonssykepleier.
- Kjøres i seng til operasjon 3H.
- Ved ankomst operasjonsstue utstyres pasienten med grønn hette på hodet.

#### **Etter operasjonen:**

- Pasienten blir hentet av sykepleier fra sengeposten.
- Det gis rapport om operasjonen og postoperative instruksjoner.
- Sjekk at alle medisinske forordninger er oppdatert i Metavision.
- Pasienten har en trykkbandasje som skal sitte på i 48 timer. Øyelege fjerner bandasjen.
- Pasienten bør hvile 1 times tid etter operasjonen.
- Pasienten kan deretter være oppe fritt.
- Observere blødning. Kontakt vakthavende øyelege ved gjennomtrukket bandasje.
- Observere postoperativ kvalme og smerte. Administrer forordnede kvalme- og smertestillende. Konferer vakthavende øyelege ved ytterligere behov.

**Vær oppmerksom på psykiske reaksjoner.**

#### **4. GENERELT**

Estimert operasjonstid er 1,5 time.

For videre postoperativ oppfølging se prosedyre: [Stell av øyehule etter enukleasjon/evicerasjon](#)

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt sykepleier på øyepoliklinikken.

For definisjon av enukleasjon/evicerasjon se vedlegg.

#### **5. REFERANSER**

#### **6. VEDLEGG**

<https://www.maignegrip.no/operasjonen/>