

## Nefrostomikateter - observasjon og forløp

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 05.09.2024

### 1. HENSIKT

Sikre riktig og optimal behandling ved nefrostomikateter.

### 2. ANSVAR

Ansvarlig lege og sykepleier for pasienten.

### 3. FREMGANGSMÅTE

- Se prosedyren: [Forberedelser til radiologiske intervensjonsprosedyrer](#). Alle spørsmål om medikasjon før og etter innleggelse av nefrostomikateter skal rettes til pasientansvarlig lege eller radiologisk avdeling.
- Nefrostomikateter legges inn på intervensjon ved radiologisk avdeling og tar normalt mellom 30 – 60 min.
- Etter innleggelse av nefrostomikateter skal pasienten ligge flatt i sengeleie og faste i 2 timer.
- Ved gjentakende stikk under innleggelsen, kan pasienten bli sendt til avdeling med komprimerende sandsekk. Denne skal ligge som anvist ved overflytting og i angitt tid.
- Grunnet risiko i etterkant av kateterinnleggelsen, skal blødning, smerter, frostrier og urinproduksjon på nefrostomikateteret observeres fortløpende.

Stell av nefrostomi: [VAR Healthcare - Portal \(varnett.no\)](#)

Skylling av nefrostomi: [VAR Healthcare - Portal \(varnett.no\)](#)

### 4. GENERELT

Brosjyren: [Nefrodren stel observasjon 99x210 6sider.pdf \(sharepoint.com\)](#) blir gitt ut til pasienten på radiologisk avdeling. Brosjyren følger pasienten gjennom forløpet på sykehuset og sendes med hjem ved utreise.

### 5. INTERNE REFERANSER

### 6. EKSTERNE REFERANSER

### 7. VEDLEGG