

MRSA-screening av polikliniske pasienter og ansatte (ikke innlagte). Prøvetaking. Mikrobiologisk avdeling

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 11.04.2024

1. HENSIKT

MRSA screening utføres for å hindre spredning av **meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA=Meticillin Resistent Staphylococcus Aureus)**. Saneringstiltak kan iverksettes dersom MRSA påvises.

2. ANSVAR

Helsepersonell som tar prøver som skal undersøkes med hensyn på MRSA. Kriterier for hvem som skal testes før arbeidsstart i helsevesenet, sykehusinnleggelse eller polikliniske undersøkelser, se [MRSA - Screening av bærerskap eller infeksjon](#) eller [MRSA - påvisning av bærerskap hos helsepersonell](#).

3. FREMGANGSMÅTE

Prøvetaking og forsendelse

Prøvene tas med Amies transportmedium med tykk pensel (sort kork). Det skal alltid tas prøve fra **nese** (ytterst i begge nesebor, samme pensel), **svelg** og **perineum**.

I tillegg tas prøve fra eventuelle andre relevante lokalisasjoner (sår, eksem og andre huddefekter, innstikksteder for fremmedlegemer) samt urinprøve hos pasienter med permanent kateter.



For screening av helsearbeidere er ikke perineumprøve nødvendig. Se «MRSA screening» i [Laboratoriehåndbok](#) for mer informasjon.

4. GENERELT

5. INTERNE REFERANSER

[1.6.10.4.2](#)

[MRSA - påvisning av bærerskap hos helsepersonell](#)

[1.6.10.4.3](#)

[MRSA - Screening av bærerskap eller infeksjon](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

[MRSA-veilederen](#)

7. VEDLEGG