

Forebygging av urinveisinfeksjon (UVI) ved bruk av permanent blærekateter (KAD)

Tiltak

1. Sikre at KAD legges inn på adekvat ordinasjon
 - Lege skal ordinere innleggelse av kateter
 - Sykepleier/lege skal dokumentere dato og indikasjon for innleggelse og seponering av kateter
2. Vurder daglig behov for alle blærekatetre
3. Systematisk opplæring i lokale prosedyrer for blærekateter for relevant helsepersonell


Eksempler på adekvate indikasjoner for bruk av KAD:

- Blæretømmingsproblemer og IK kan ikke benyttes
- Akutt urinretensjon eller obstruksjon av uretra
- Etter akutt urinretensjon for å avlaste urinblæren en periode
- Måling av diurese hos kritisk syke pasienter
- Kontinuerlig gjennomskylling av urinblæren
- Perioperativt ved visse kirurgiske inngrep
- Bidra til tilheling av åpne sakrale eller perineale sår hos inkontinente pasienter
- Pasienter immobilisert over lang tid (eks. multitraumer med bekkenfraktur)
- Økt komfort ved terminal pleie

Har pasienten hatt blærekateter i mer enn to døgn?
eller

Har pasienten hatt blærekateter i mer enn to døgn
og er dette fjernet det siste døgnet?

Pasienten har en helsetjenesteassosiert urinveisinfeksjon
som er kateterrelatert



Pasienten har IKKE en helsetjenesteassosiert urinveisinfeksjon
som er kateterrelatert