

## Rekvisisjonskjema TEG (Tromboelastografi)

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Skjema  
Sist endret: 26.08.2017



Avdeling: \_\_\_\_\_

Rekvirent: \_\_\_\_\_

Tlf.nr. Blodbanken skal ringe når svaret er klart: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Klokkeslett \_\_\_\_\_

- Standard TEG (citrat prøverør, blå kork)
- Rapid TEG (citrat prøverør, blå kork)

**VIKTIG: Prøverøret må være fylt helt opp og forsiktig snudd opp ned x5 for å forhindre oppstart av koagulering)**

- Arteriell prøve (10 ml med blod kastes før man samler blod i prøverøret)
- Venøs prøve (3 ml med blod kastes før man samler blod i prøverøret / 10 ml hvis blodprøve tas fra CVK-line/picc-line/midline/PVK)

**Type prøve:**

- Preoperativ
- Ved anestesistart
- Etter at protamin er gitt
- Postoperativ prøve
- Annet \_\_\_\_\_

Har pasienten fått heparin siste 48 timer? Ja Nei

Har pasienten fått platehemmer siste 7 dager? Ja Nei

Hva slags platehemmer? \_\_\_\_\_

Bruker pasienten warfarin?

Ja

Nei

Bruker pasienten NSAID?

Ja

Nei

**Blodbankens personale (tlf 3080) skal informeres før prøve sendes. Husk også å bestille analysen i DIPS.**

Prøven tatt av: \_\_\_\_\_

# TEG PRØVE MÅ GJØRES KORREKT

**Man må** få dette blodet inn i et prøverør tilsatt citrat (blå kork)

**Man må** fylle dette prøverøret helt fullt (ellers kan analysen ikke utføres)

**Man må** snu prøverøret opp-ned minst 5 ganger for å unngå oppstart av koagulasjon

**Man må** bruke en DIPS-klistremerke lapp med ID av pasient både på rekvisisjonen og prøverøret.

**Man må føre opp** tidspunkt prøven ble tatt på rekvisisjon og prøverør

**Man må** få levert prøverøret til blodbanken innen 15 minutter fra prøvetaknings-tidspunkt