

Informasjon til pasient om feber ved Cellegiftbehandling

Gjelder for:	Hele SiV
Dokumenttype:	Pasientinformasjon
Sist endret:	29.05.2018

Informasjon om feber ved cellegiftbehandling

Behandling med cellegift reduserer immunforsvaret ved at antall hvite blodlegemer (leukocytter og nøytrofile) blir lavt. Dette øker risikoen for infeksjoner.

Antall hvite blodlegemer er som regel lavest i perioden 6 – 14 dager etter start av cellegiftkuren.

Det vanligste tegn på infeksjon er feber, frysninger og/eller kraftig sykdomsfølelse. Selv relativt lav temperatur må du ta alvorlig. Dersom du føler deg varm skal du måle temperaturen. Har du målt temperaturen 38,0 to ganger med en times mellomrom, eller mer enn 38,5 grader en gang, må du øyeblikkelig ta kontakt med sykehuset (selv om det er midt på natten). Det er viktig å oppgi at du får cellegiftbehandling og når du fikk siste kur. Noen medisiner kan skjule feber (f.eks. paracetamol, kortison, medrol, prednisolon, dexametason).

Andre symptomer og tegn på infeksjon med eller uten feber kan være:

- lokal smerte
- røde og varme hudområder
- frostanfall
- uforklarlig slapphet

Blødningssymptomer, som blødning fra nese, mage-tarm kanalen og/eller hud, bør også behandles på sykehuset.

Når du får behandling med cellegift har du «Åpen innleggelse» i sykehuset.

Åpen innleggelse/retur betyr at du henvender deg direkte til akuttmottaket, uten å gå gjennom fastlege eller legevakt.

Ring for åpen innleggelse/retur:

Ansvarshavende sykepleier, akuttmottaket tlf. 33 34 22 20

På sykehuset vil du bli undersøkt av lege. Det vil bli tatt blodprøver og andre nødvendige undersøkelser. Lavt antall hvite blodlegemer og feber vil som regel føre til innleggelse og antibiotikabehandling. Gi beskjed hvis du har allergi for bestemte typer antibiotika.

Ha alltid denne informasjonen med deg.