

Trakeostomi - stell, suging, skifte

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Retningslinje
Sist endret: 30.07.2024

1. HENSIKT

Opprettholde frie luftveier, ivareta stoma, forbygge infeksjon

2. ANSVAR

Sykepleier eller annet kvalifisert helsepersonell som kjenner prosedyren og teknikken, kan utføre prosedyren. Alle somatiske sengeposter skal ha kompetanse til å ivareta pasienter med trakeostomi. Medisinsk Overvåking og Intensiv kan bistå med nødvendig opplæring og veiledning for håndtering av trakeostomi, dersom sengeposten har behov for det.

3. FREMGANGSMÅTE

Ved SiV skal stell av trakeostomi utføres med to helsepersonell med opplæring.

[VAR - Stell av etablert trakeostomi](#)

[VAR - Stell av nyetablert trakeostomi](#)

[VAR - Rengjøring og skifte av trakealkanyle](#)

[VAR – Sugning i trakealkanyle](#)

Ved trakealsuging er det EK-retningslinjene som er styrende:

- [Trakealsuging med åpent sug - via endotrakealtube/trakeostomi](#)
- [Trakealsuging med lukket sug - via endotrakealtube/trakeostomi hos respiratorpasienter](#)

4. GENERELT

5. INTERNE REFERANSER

[2.1.5.1.1.4.3.24](#) [Trakealsuging med lukket sug - via endotrakealtube/trakeostomi hos respiratorpasienter](#)

[2.1.5.1.1.4.3.25](#) [Trakealsuging med åpent sug - via endotrakealtube/trakeostomi](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG

