

Forberedelser til konvensjonell radiologisk undersøkelse for pasienter som transporteres i seng

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Retningslinje
Sist endret: 22.08.2024

1. HENSIKT

Å tilstrebe optimal bildekvalitet ved eliminering av artefakter.
Å tilstrebe optimale projeksjoner for påfølgende radiologi svar.
Å tilstrebe best mulig effektiv bruk av radiologisk utstyr og personell.

2. ANSVAR

Pasient ansvarlig sykepleier/helsefagarbeider.

3. FREMGANGSMÅTE

Klær/avkledding

Ta av privat tøy og ifør pasienten sykehuskjorte.
Pasienten kan beholde intimplagg med unntak av brystholder.

EKG lapper skal tas bort før undersøkelsene RG Thorax og RG Abdomen.

Smykker/verdisaker

Ta av smykker og fjern personlige eiendeler fra undersøkelses området.
Følg sykehusets prosedyrer for oppbevaring av verdisaker jfr. [DIPS - Registrering av verdisaker \(sykehuspartner.no\)](#).

Smertelindring

Svært smertepåvirkede pasienter bør smertelindres før de kommer til undersøkelse.
Undersøkelser kan medføre forflytning og posisjonering som kan oppleves krevende for pasienten.

Toalettbesøk

Pasienter må få tilbud om å få gå på toalettet før de sendes til undersøkelse.
Unntak er ved tilfeller hvor annet er bestemt.

Smitte

Pasienter med påvist smitte må komme i ren seng og i rent tøy.
Radiograf må informeres om smitte hos pasient ved avtale av undersøkelses tidspunkt.

RG Abdomen

Pasienter skal ligge på sin venstre side fra de forlater post.

RG Tarmpassasje

Gastografin hentes på røntgen lab av personell på post.
Informasjon blir gitt til den som henter Gastrografen.
Se prosedyre:
[RG Tarmpassasje \(sykehuspartner.no\)](#)

Pasientforløp – brudd i øvre del av lårbenet

Se prosedyre:

[Pasientforløp - brudd i øvre del av lårbenet. Pasienter > 65 år \(sykehuspartner.no\)](#)

4. GENERELT

Pasienter som sendes til konvensjonell radiologisk undersøkelse må kunne ligge alene/uten observasjon. Dette gjelder både i påvente av undersøkelse og etter undersøkelsen i påvente av portør tilbake til post. Hvis pasientens tilstand krever tilsyn/observasjon må sykepleier følge.

Dersom pasientens tilstand krever tilførsel av oksygen må o2 kolben inneholde tilstrekkelig med oksygen for transport, og sikres godt til sengen før pasienten sendes til radiologisk avdeling.

5. INTERNE REFERANSER

6. EKSTERNE REFERANSER

7. VEDLEGG