

Kohortisolering

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 24.03.2025

1. HENSIKT

Hindre smittespredning.

2. ANSVAR

Behandelnde lege avgjør om en pasient skal isoleres eller ikke, og hvilket isoleringsregime som skal brukes.

3. FREMGANGSMÅTE

Kohortisolering vil si at flere pasienter med samme smittestoff isoleres på samme rom. Brukes ved infeksjonsutbrudd der det er uhensiktsmessig eller umulig å isolere pasientene enkeltvis.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å benytte hele eller deler av en sengepost til kohortisolering.

3.1 Gjennomføring av kohortisolering

- Rom / område må ha eget toalett og dusj som bare benyttes av de kohortisolerte pasientene.
- Rom / område merkes med dørplakat som angir isoleringsregime:
[Kontakt -og dråpesmitte -tiltak](#)
[Luftsmitte- tiltak](#)
- Følg [Basale smittevernrutiner](#) med hensyn til håndhygiene, skifte av hansker og annet forurenset personlig verneutstyr mellom kontakt med pasienter.
- Samme munnbind kan brukes når helsepersonell går fra pasient til pasient inne på rommet.
- Frakk bør som hovedregel byttes mellom hver pasient. Alternativt kan plastforkle brukes utenpå smittefrakken og forkleet byttes mellom hver pasient.

3.2 Opphør av isolering

Kohortisoleringen opphører når siste pasient er smittefri eller utskrevet.

[Kontakt- og dråpesmitteisolering-tiltak ved opphør](#)
[Luftsmitte-tiltak ved opphør](#)

4. GENERELT

5. INTERNE REFERANSER

1.6.10.2.1	Basale smittevernrutiner
1.6.10.3.2	Kontakt- og dråpesmitte- tiltak
1.6.10.3.3	Kontakt- og dråpesmitteisolering - tiltak ved opphør
1.6.10.3.5	Luftsmitte - tiltak
1.6.10.3.6	Luftsmitte - tiltak ved opphør
1.6.10.5.3	Oppklaring av infeksjonsutbrudd

6. EKSTERNE REFERANSER

FHI: [Smittevern i heletjenesten](#)
FHI: [Isoleringsveilederen](#)

7. VEDLEGG